



مبيد حشري يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي ذو فعالية واسعة النطاق ضد الحشرات على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات .

التركيب : كل لتر يحتوي على:

سبينوساد (SPINOSYN A&D) ٤٨ ٪ و / ح (مادة فعالة)

الخواص :

سبانوسيكيت ماكس : مبيد حشري ينتمي لمجموعة المبيدات الحيوية .

سبانوسيكيت ماكس : مبيد ذو كفاءة عالية في مكافحة مدى واسع من الحشرات الواردة في جدول الاستعمالات .

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ١٠٠ لتر من الماء	عدد الرشات	المدة بين الرشات	حجم محلول الرش	ملاحظات	فترة الأمان (يوم)
السلق، السيانخ	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس	٢٠ مل	١	---	١٠٠٠ لتر / هكتار	الجرعة القصوى: ٠,٢ لتر/ هكتار	٣
الشمندر السكري	الخنافس	٠,٢ لتر/ هكتار	٢	٨	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	لإنتاج البذور: يتم التطبيق عن طريق الرش العادي بالجرار في مرحلة ما قبل التزهير.	---
البقدونس الكرفس	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	٨٠٠ لتر/ هكتار	الجرعة القصوى: ٠,٢٥ لتر/ هكتار. يستعمل فقط لمحاصيل إنتاج أوراق الكرفس.	٣
الجرجير، البروكلي الزهرة، الخس	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	يطبق في الأراضي المفتوحة فقط. الجرعة القصوى ٠,٢ لتر/ هكتار.	٣
الملفوف، الكرنب	حشرات حرشفية الأجنحة	٠,٢ لتر/ هكتار	٢	٨	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	يتم تطبيقه عن طريق الرش بالجرار في مرحلة النمو الخضري الورقي.	٣
أشجار الفاكهة	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس، ذباب الفاكهة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	(استخدام البيوت البلاستيكية فقط). (حصريا للبلالكي بيرى، التوت / الكشمش). يطبق باستخدام لانس أو مسدس الرش. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/ هكتار.	٧
الكرز، البرقوق القراصيا			٢	٨		يتم تطبيقه عن طريق الرش العادي بالجرار أو باليد. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر / هكتار	
الخوخ، الشمش			٢	٧		تشمل زراعة أشجار الخوخ أصناف مختلفة ويجب إجراء تجارب صغيرة لاختيار أي سمية نباتية قد تحدث. الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/ هكتار لكل تطبيق.	
التوت			٣	٧		(يستخدم في البيوت البلاستيكية فقط). (حصريا لإنتاج الفاكهة، التوت الأسود أو الأبيض). يطبق باستخدام لانس أو مسدس الرش. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/ هكتار.	

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ١٠٠ لتر من الماء	عدد الرشات	المدة بين الرشات	حجم محلول الرش	ملاحظات	فترة الامان (يوم)
الأجاص	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس، ذبابة الفاكهة	٢٠ - ٢٥ مل	٢	١٤	٨٠٠ لتر / هكتار	يجب البدء بالتطبيق عندما يبدأ البيض في الفقس. الجرعة القصوى ٠,٣ لتر/هكتار. بالنسبة للنashi pear، يتم تطبيقه عن طريق الرش باستخدام جرار في مرحلة ما بعد الإزهار، مرتين كحد أقصى بفاصل ١٤ يوماً بجرعة ٢٥ مل/ هكتار، وحجم محلول رش ٨٠٠ مل/ هكتار بحد أقصى ٠,٢ لتر/ هكتار.	٧
	السفرجل					الحد الأقصى ٠,٢ لتر/هكتار. يتم التطبيق عن طريق الرش العادي بالجرار بعد التزهير.	
	التفاح		١	---	---	يجب البدء بتطبيق المبيد عندما يبدأ البيض في الفقس. الجرعة القصوى ٠,٣ لتر/هكتار.	
العنب	التريس، الخنافس البرغوثية، خنفساء كولورادو، خنفساء الورد المرقطة البيضاء، العنث، تورتريكس ورق العنب، دودة العنب الأوروبية	٢٠ - ٢٥ مل	٢	٧	٢٠٠ - ٥٠٠ لتر/ هكتار	الجرعة القصوى ٠,٢ لتر/هكتار.	١٤
الباذنجان، الفلفل، البندورة	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	يستعمل في الأراضي المفتوحة والبيوت البلاستيكية والاستخدام المحمي. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/ هكتار.	٣
البطاطا	الخنافس	٥٠ - ٧٥ مل			---	---	٧
الكوسا، البطيخ، الخيار القرع، الشام	ذبابة القرع الصفري، التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	٨٠٠ - ١٠٠٠ مل/ هكتار	يستخدم في الأراضي المفتوحة، والبيوت البلاستيكية والاستخدام المحمي. الحد الأقصى ٠,٢٥ لتر/ هكتار. يتم تطبيقه عن طريق الرش العادي بالجرار (قبل أو بعد الإزهار الكامل). (الجرعة الثانية) حصرياً ضد ذبابة القرع.	٣
الخضروات (إنتاج البذور)	الخنافس	٠,٢ لتر/ هكتار	١	---	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	إنتاج بذور النبات: يتم الرش العادي بالجرار في مرحلة ما قبل التزهير.	---
البصل، الكراث، الثوم، الثوم المعمر	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٠,٢ لتر / هكتار ٢٠ - ٢٥ مل	٢	٨	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار ---	يتم التطبيق عن طريق الرش العادي بالجرار أو باليد. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢ لتر/ هكتار.	٧
البازيلاء الخضراء الفول، الفاصولياء الخضراء	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	١٠٠٠ - ١٢٥٠ لتر/ هكتار ---	يستخدم في الأراضي المفتوحة، والبيوت البلاستيكية والاستخدام المحمي. الجرعة القصوى لكل تطبيق ٠,٢٥ لتر/ هكتار.	٧
حبوب البقوليات	العنث، الخنافس، السوس	٠,٢ لتر/ هكتار	١	---	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	إنتاج بذور النبات: يتم الرش بالجرار في مرحلة ما قبل التزهير.	---

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ١٠٠ لتر من الماء	عدد الرشات	المدة بين الرشات	حجم محلول الرش	ملاحظات	فترة الامان (يوم)
الفراولة	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس، ذبابة الفاكهة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	يستخدم في الأراضي المفتوحة، والبيوت البلاستيكية والاستخدام المحمي. الجرعة القصوى لكل تطبيق ٠,٢٥ لتر/هكتار. في الدفيئة يتم تطبيقه باستخدام مسدس الرش.	٣
الخرشوف	حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	الجرعة القصوى: ٠,٢٥ لتر/هكتار.	٣
القطن	حشرات حرشفية الأجنحة	١٠٠ - ١٥٠ مل/ هكتار	٣	٧	---	ابدأ العلاج عندما يبدأ البيض في الفقس.	٢١
الذرة الحلو	حفار ساق الذرة	١٠٠ - ١٥٠ مل/ هكتار	٢	١٤	---	يتم تطبيقه بطريقة محورية باستخدام عبوات سعة ٢٥٠ مل فقط.	١٤
الذرة	حشرات حرشفية الأجنحة	٠,٢ لتر/ هكتار	٢	١٠	٨٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	لإنتاج بذور الذرة، يستخدم في الأراضي المفتوحة والاستخدام المحمي. يتم التطبيق عن طريق الرش بالجرار. تجنب التطبيق على المحصول المزهري.	١٠
الموز	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة، الخنافس	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	---	يجب البدء بالتطبيق عندما يبدأ البيض في الفقس. الجرعة القصوى ٠,٣ لتر/هكتار.	٧
الغار	حشرات حرشفية الأجنحة، التريس	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	١٠٠٠ - ١٢٥٠ لتر/ هكتار	حصرياً للمحاصيل المخصصة للاستهلاك الغذائي. الجرعة القصوى: ٠,٢٥ لتر/ هكتار.	٣
الرجلة الخردل الصيني نبات الزينة العشبية	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	١٠٠٠ - ١٢٥٠ لتر/ هكتار	الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/هكتار.	٣
	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	١٠٠٠ - ١٢٥٠ لتر/ هكتار	الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/هكتار.	
	الخنافس	٠,٢ لتر/ هكتار	١	---	٥٠٠ - ١٠٠٠ لتر/ هكتار	حصرياً لمحاصيل إنتاج البذور: يتم تطبيقه عن طريق الرش العادي بالجرار في مرحلة ما قبل التزهير.	
الأعشاب العطرية والزهور الصالحة للأكل (المربية الملكية وإكليل الجبيل والزعتر والريحان والطرخون)	التريس	٢٠ - ٢٥ مل	١	---	١٠٠٠ - ١٢٥٠ لتر/ هكتار	الجرعة القصوى: ٠,٢٥ لتر/هكتار.	٣
الورد	التريس، حشرات حرشفية الأجنحة	٢٠ - ٢٥ مل	٣	٧	---	(يستخدم في البيوت البلاستيكية فقط). تطبيق باستخدام لانس أو مسدس رش. لا تتجاوز الجرعة القصوى ٠,٢٥ لتر/هكتار.	---

● للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديثات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

تحذير :

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا تستخدم المبيد في الأماكن التي يتواجد بها النحل بشكل نشط.
- للاستخدام ضد التريس في محاصيل البطيخ والكراث، أثناء فترة وصول الحشرات البالغة إلى الحقل، قبل تطبيق المنتج، يجب أولاً تطبيق العلاج بمنتج متخصص له تأثير صاعق قوي.
- في البيوت البلاستيكية، يجب ابقاء خلايا النحل مغلقة أثناء التطبيق. حيث أنه بمجرد أن يجف رذاذ المبيد ، يمكن إعادة فتح خلايا النحل.
- في حالة المحاصيل التي تتواجد بها الحشرات و/أو العث المفترس للمكافحة البيولوجية، يوصى بالتطبيق بمجرد استقرار تعدادها بشكل جيد مع بقاء الظروف الجوية مناسبة لاستردادها (الربيع والصيف وأوائل الخريف).

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المركبات القلوية و ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش ويفضل استعمال المبيد فوراً.