



كلوميفاب

(سائل معلق)
للأغنام والحملان

التركيب:

كلوزانتيل	50 ملغم
ميبندازول	75 ملغم

الاستطبابات:

لعلاج ومكافحة ديدان الكبد ، والديدان المعوية، والديدان الرئوية، والديدان الشريطية، ومراحل اليرقات لبعض المفصليات.

تريماتود:

ديدان الكبد:

فاشيولا هيباتيكا (البالغة + صغار السن من 5 إلى 8 أسابيع)
فاشيولا جيجانتيكا (البالغة + صغار السن من 8 أسابيع)

النيماتودا:

الديدان الأسطوانية:

هايمونكس كونتورتوس، بونوستوموم، شابيرتيا أوفينا، غايجيريا باكيسيليس، أويسوفاغوستوموم، كابيلاريا، كوبريا،
نيماتوديروس، أوسترتاجيا سيركومسينتا، تريكوسترونجيلوس أكسي، تريكوسترونجيلوس كولوبريفورميس،
تريكوسترونجيلوس فيترين، تريكوريس أوفيس، سترونجيلويدس بابيلوسوس.

ديدان الرئة:

ديكتيوكولوس خيطية.

الديدان الشريطية:

أفيتيلينا، مونيزيا.

المفصليات:

أوستروس أوفيس (الدودة الأنفية)، القراد (إكسوديس ريسينوس) التي تتغذى على الأغنام وقت العلاج، من المرجح أن
تنتج عددًا أقل من البيض الحي.



الجرعة وطريقة الاعطاء:

- للإعطاء عن طريق الفم بواسطة أداة التجريع.
- رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.
- الجرعة الموصى بها هي ١ مل لكل ٥ كغم من وزن الجسم.
- يجب إعطاء جميع الأغنام في المراعي المصابة جرعاً منتظمة خلال موسم الديدان المثقوبة. تعتمد الفترة الفاصلة بين الجرعات على مستوى تلوث المراعي؛ في مواسم الديدان المثقوبة الشديدة، قد يلزم إعطاء الجرعة كل ٦-٨ أسابيع. هذا الدواء فعال ضد ببيض الديدان ويمنع تلوث المراعي ببيض الديدان المثقوبة لمدة ١٣ أسبوعاً تقريباً.
- يُنصح بفترات علاج تتراوح بين ١٠ و ١٢ أسبوعاً طوال موسم الديدان المثقوبة.

الجرعة الزائدة:

أعراض الجرعة الزائدة الحادة من كلوزانتيل هي ضعف البصر أو العمى، وفقدان الشهية، وعدم التناسق الحركي، وضعف عام.

فترة السحب:

اللحوم ومشتقاتها: 65 يوماً.

غير مصرح باستخدامه للنعاج المنتجة للحليب للاستهلاك البشري، بما في ذلك خلال فترة الجفاف. لا يُستخدم خلال عام واحد قبل أول ولادة للنعاج المخصصة لإنتاج الحليب للاستهلاك البشري.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من 30 °م.

للاستعمال البيطري فقط