



مبيد عشبي زراعي سام

مركز قابل للذوبان

مبيد عشبي اختياري يعمل بالملامسة يمتص عن طريق المجموع الخضري للأعشاب كما أنه يمتص عن طريق الجذور، يكافح عدد من الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

بننازون ٤٨ % و/ح (مادة فعالة)

الخواص :

بلاست- ٤٨ % : مبيد عشبي اختياري بعد الانبات يكافح الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

بلاست- ٤٨ % : يثبط عملية التمثيل الضوئي مما يؤدي إلى ظهور أعراض الاصفرار التي تتطور إلى نخر والسيطرة على النمو الجديد.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	١٧٧ مل / دونم	٢٣٦ مل / دونم
		عدد الأوراق	عدد الأوراق
		أقصى ارتفاع للأعشاب (سم)	أقصى ارتفاع للأعشاب (سم)
البرسيم	حبة القلب	٤-٢	٦-٤
المزروع للبذور،	قلب المائي	حتى ٦ ورقات	٨-٦
الفاصوليا،	المدادة ^(١)	---	---
الذرة، الفول	الحنطة السوداء	حتى ٤ ورقات	٦-٤
السوداني،	الشبيط ^(١,٢)	٦-٢	١٠-٦
البازيلاء،	الشوك البري	حتى ورقتين	٤-٢
فول الصويا،	البومية	حتى ٦ ورقات	١٠-٦
الذرة الرفيعة،	مخلب الشيطان ^(٢)	---	حتى ٦ ورقات
التنوع،	زهرة الشيخ	---	---
الأشجار	عشبة جمسون	حتى ٦ ورقات	١٠-٦
المثمرة بعد	عصا الراعي	حتى ٦ ورقات	١٠-٦
جني المحصول	رجل الاوز ^(١,٢)	حتى ٦ ورقات	٤
وقبل الاثمار*	الشيخ	حتى ٤ ورقات	٨
	الأخوان	---	---
	شب النهار ^(١)	٤	٦
	الخردل البري	حتى ٦ ورقات	١٠-٦
	عنب الديب	---	٦-٢
	بوانسية ^(٢)	حتى ٦ ورقات	٨-٤
	الرجلة	حتى ٤ ورقات	٦-٤
	الفجل البري	٦-٢	١٠-٦
	عشبة الخنزير ^(٢)	---	٦-٤
	العشبة الحمراء ^(١)	---	حتى ٤ ورقات
	سنا ^(٢)	---	حتى الورقة الأولى
	سسيان ^(٢)	---	٥-٣
	كيس الراعي ^(٢)	حتى ٦ ورقات	١٠-٦
	عشبة ابو مليون	حتى ٦ ورقات	٨-٦
	عشبة دوار الشمس	حتى ٤ ورقات	٦-٤

* للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

- (١) المادة: يطبق ٢٣٦-٣٥٥ مل/دونم، واقصى ارتفاع ٢٥ سم للعشبة للقمع فقط.
 الشبيط: يطبق مره واحدة ٢٣٦-٣٥٥ مل/دونم، لاقصى ارتفاع ٦١ سم، ولتحسين الفعالية يطبق ١٧٧ مل/دونم مباشرة، ويعاد الرش بعد ١٠-١٤ يوم.
 (٢) لا يطبق بمرحلة مبكرة قبل ظهور الاوراق، ولا تحسب اوراق القلقوتين.
 (٣) يستخدم زيت المحاصيل بالاضافة الى محلول يوريا-نترات الامونيوم.
 (٤) في حال عودة الانبات للاعشاب كرر الرش بالمبيد حتى تتخلص منها حسب الضرورة.
 (٥) يعاد الرش بمعدل ٢٣٦-٣٥٥ مل/دونم، بمرحلة وجود اكثر من ٤ ورقات بعد ٧-١٤ يوم.
 (٧) لا يتم الرش قبل ظهور محاميل البذور (ساق الزهرة) / (حامل البذور).
 * اللوز، التفاح، المشمش، الأفوكادو، التوت، الكرز، التمر، التين، العنب، الجريب فروت، الليمون، الخوخ، الزيتون، البرتقال، الخوخ، الكمثرى، البرقوق، الرمان.

البرسيم المزروع للبذور:

- لا تستخدمه على البرسيم المنتج لتغذية الماشية.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دونم في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرتين في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة في غضون فترة ٧ أيام.

الفاصوليا:

- يطبق بعد ظهور وتوسع أول ثلاثية أوراق بالكامل.
- لا تستخدم الحمص أو الترمس في أي مرحلة من مراحل النمو.
- لا تستخدم الفاصوليا الجافة أو الخضراء خلال ٣٠ يوماً من الحصاد.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دونم، سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرتين سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة خلال فترة ٥ أيام.

الذرة:

- لا ترعى الذرة المعالجة لمدة ١٢ يوماً على الأقل بعد آخر معاملة رش.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دونم، سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرتين سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة خلال فترة ٥ أيام.

التنوع:

- لا تستخدمه خلال ٢٠ يوماً من الحصاد.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دونم سنوياً.
- لا تستخدمه أكثر من مرتين سنوياً.
- لا تستخدمه أكثر من مرة واحدة خلال فترة ٥ أيام.

البازلاء :

- لا تطبق على البازلاء المصابة بتعفن الجذور.
- لا تستخدمه في الحمص أو الترمس في أي مرحلة من مراحل النمو.
- لا تستخدم هذا المنتج عندما تكون البازلاء في مرحلة التفتح.
- لا تضاف مركز لزيت للاستخدام على البازلاء.
- قد تؤدي معالجات التبقع بالمبيدات الحشرية أو مبيدات النيماتودا إلى تعريض البازلاء للإصابة من بلاست- ٤٨%.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دوغم، في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرتين في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحد خلال فترة ه أيام.

الذول السوداني :

- لا ترعى لمدة ٥٠ يوماً على الأقل بعد آخر معالجة رش.
- يمكن تغذية الماشية بقش الذول السوداني والأعلاف المعالجة ب بلاست- ٤٨%.
- قد تؤدي معالجات المبيدات الحشرية أو مبيدات الديدان الخيطية في الأخاديد إلى تعريض الذول السوداني للإصابة من بلاست- ٤٨%.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دوغم في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرتين في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة في غضون فترة ه أيام.

الذرة الرفيعة :

- لا تستخدمه في مرحلة نمو السنابل أو الإزهار.
- لا ترعى لمدة ١٢ يوماً على الأقل بعد آخر معاملة.
- لا تستخدم أكثر من ٢٣٦ مل/دوغم، سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة سنوياً.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة خلال فترة ه أيام.

فول الصويا :

- لا ترعى أو تقطع حقول فول الصويا المعالجة للحصول على العلف أو التبن لمدة ٣٠ يوماً على الأقل بعد آخر معاملة.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دوغم، سنوياً.
- لا تقم بأكثر من تطبيقين سنوياً.
- لا تقم بأكثر من تطبيق واحد خلال فترة ه أيام.

المحاصيل غير الممتدة (اللوز، التفاح، المشمش، الأفوكادو، التوت، الكرز، التمر، التين، العنب، الجريب فروت، الليمون، الخوخ، الزيتون، البرتقال، الخوخ، الكمثرى، البرقوق، الرمان) :

- لا تستخدم الطائرات أو أي معدات جوية تؤدي إلى رش واسع النطاق.
- لا ترعى الحيوانات في البساتين أو الحقول المعاملة.
- لا تستخدم التبن من المناطق المعاملة لتغذية الحيوانات.
- لا تستخدم خلال عام واحد من الحصاد.
- لا تستخدم أكثر من ٤٧٣ مل/دوغم في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرتين في السنة.
- لا تستخدم أكثر من مرة واحدة في غضون فترة ه أيام.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع جميع هبيدات ما عدا القلوية منها و لكن يجب عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل لمرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.