



زوكسانيل - ٦٦%

المجموعة:
Benzamide⁽¹⁾
Cyanoacetamide Oxime⁽²⁾

مبيد فطري زراعي سام

حبوبات قابلة للانتشار بالبادجان

مبيد فطري ذو تأثير جهازي وقائي، علاجي لمكافحة الامراض الفطرية على العنب واللفحة المتأخرة على البندورة والبادنجان والبطاطا.
التركيب: كل كغم يحتوي على:

زوكساميديد⁽¹⁾ ٣٣٪ و/و (مادة فعالة)
سايموكسانيل⁽²⁾ ٣٣٪ و/و (مادة فعالة)

الخواص:

زوكسانيل - ٦٦% : مبيد وقائي وعالجي فعال لمكافحة الامراض الفطرية على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.
زوكسانيل - ٦٦% : يتكون من مادتين فعاليتين أحدهما سايموكسانيل تعمل على منع تكوني الأبواغ الفطرية (السبورات)، كما يتكون أيضاً من مادة زوكساميديد حيث أنها متخصصة ضد الفطريات البيضية (Oomycetes) وتعمل على منع انقسام الخلايا للفطريات وتوقف نموها ونمو الأبواغ الفطرية (السبورات).

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	الفترة بين الرشات (أيام)	موعد الرش	عدد مرات الرش	معدل الاستعمال لتر/ماء	الأمراض	المحصول
٢٨	٧	يببدأ الرش عند وصول النبات الى مرحلة ٤ ورقات.	٣ في الموسم	٨ جرام	البياض الزغبي	العنبر
٧	٧	يببدأ الرش من مرحلة تطور الفرع الجانبي الأول (٥ سم).		٩ جرام	اللفحة المتأخرة	البطاطا
٣	١٠ - ٧	يببدأ الرش عند وصول النبات الى مرحلة ٣ ورقات.		٩-٨ جرام	اللفحة المتأخرة	البندورة، البادنجان

تحذير:

- يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- أخذ بعض الاعتبار التخطيطية الشاملة عند الرش.
- طريقة التطبيق: الرش الورقي.

فتررة تحرير دخول الحقل المرشوش:

عدم دخول الحقل المرشوش قبل جفاف محلول الرش على المحصول المعامل من آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: غير قابل للخلط مع المواد القلوية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.