

مغنيسيوم-بروفاب

سماد نباتي
سائل قابل للذوبان



التركيب : كل لتر يحتوي على :

مغنيسيوم ٥٠ % و/ح (مادة فعالة)

الخواص :

مغنيسيوم - بروفاب : يتكون من مادة المغنيسيوم يستعمل لتصحيح نقص عنصر المغنيسيوم في المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

مغنيسيوم - بروفاب : هو مصدر فعال لعنصر المغنيسيوم يمتص عن طريق الرش الورقي.

الاستعمالات :

المحصول	جرعة الاستخدام	معدل الاستعمال
الخضروات الجذرية والدرنات، الجزر، الجنسنج، البقدونس، البطاطا، الفجل، الشمندر السكري، البطاطا الحلوة	٧٠٩,٨-٢٣٦,٦ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٤ إلى ٢١ يوم حتى الحصاد.
الثوم، البصل والكراث	١٧٣,٢-١١٨,٣ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم حتى الحصاد.
الكرفس، الخس، السبانخ	١٧٣,٢-١١٨,٣ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم حتى الحصاد.
البروكلي، الملفوف، الزهرة	١٧٣,٢-٢٣٦,٦ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم حتى الحصاد.
القاصوليا، البازيلاء، فول الصويا	٧٠٩,٨-٢٣٦,٦ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم، الرش قبل ١٠ أيام من الحصاد يمكن ان يحسن لون الثمار (اللون الاخضر).
الباذنجان، الفلفل، البندورة	١٧٣,٢-٢٣٦,٦ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ ورقات او بعد الزراعة. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم حتى الحصاد.
الشمام، الخيار، الكوسا، البطيخ	١٧٣,٢-٢٣٦,٦ مل/دوتم	الرشعة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن إعادة الرش خلال ١٠ إلى ١٤ يوم حتى الحصاد. الرش قبل ١٠ أيام من الحصاد يمكن ان يحسن لون الثمار (اللون الاخضر).
جريب فروت، الليمون، البرتقال، الكلمنتينا	٩٤٦,٣٥ - ٢٣٦,٦ مل/دوتم	يتم تطبيقه قبل تدفق الجذور في الربيع والصيف او عندما تظهر علامات تراكم السكر في الاوراق بسبب عدم كفاية حركة الفسفور. عند الحاجة يمكن إعادة الرش بعد ١٤ يوم.

المحصول	جرعة الاستخدام	معدل الاستعمال
التفاح، الاجاص	٢٣٦,٦ - ٧٠٩,٨ مل/دونم	يبدأ عن سقوط البتلات، يستمر الرش حتى الحصاد.
المشمش، الكرز، الدراق	٢٣٦,٦ - ٧٠٩,٨ مل/دونم	تبدأ عند ظهور الأوراق الكاملة. يمكن التكرار حسب الحاجة كل ١٤ إلى ٢١ يوماً حتى الحصاد.
التوت البري، التوت الأزرق، الكيوي، التوت، العنب	٢٣٦,٦ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور الورقة الكاملة. الرشة الثانية: قبل الإزهار. يمكن التكرار حسب الحاجة كل ١٤ إلى ٢١ يوماً حتى الحصاد.
القراولة	٢٣٦,٦ - ٧٠٩,٨ مل/دونم	الرشة الاولى: بعد الزراعة. الرشة الثانية: بعد ١٠ إلى ١٤ يوماً قبل الإزهار. يمكن التكرار حسب الحاجة كل ١٤ إلى ٢١ يوماً حتى الحصاد.
اللوز، الكاجو	٢٣٦,٦ - ٩٤٦,٣٥ مل/دونم	تبدأ عند ظهور الأوراق الكامل. يمكن التكرار حسب الحاجة كل ١٤ إلى ٢١ يوماً حتى الحصاد.
الحبوب، الشعير، الذرة، الشوفان، الأرز، الذرة الرفيعة، القمح	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن الرش بعد ١٤ إلى ٢١ يوم حتى شيخوخة الورقة.
الاعلاف، قش الحبوب	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن الرش بعد ١٤ إلى ٢١ يوم حتى شيخوخة الورقة.
علف الاعشاب، والاعلاف والقش	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: في ظهور ٢-٤ أوراق. قد تؤدي التطبيقات الإضافية بين القطع إلى تحسين جودة العلف وزيادة قوة الحامل.
اعلاف الحيوانات الغير عشبية بما في ذلك البرسيم، القش	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	تطبق في مرحلة ٢ إلى ٤ أوراق ثلاثية. بالنسبة للمحصول الراسخ، اظهر التطبيق عند مرحلة الاخضرار وبعد ٥ إلى ١٠ ايام من كل عملية قطع تحسناً ملحوظاً في جودة العلف.
الاعشاب والتوابل (الريحان، الخردل، الميرمية)	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن تكرار التطبيق كل ١٤ إلى ٢١ يوم حتى الحصاد.
محاصيل البذور الزيتية (الكتان، عباد الشمس)	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن الرش بعد ١٤ إلى ٢١ يوم حتى شيخوخة الورقة.
الساق واوراق الخضروات، الهليون، الكرفس	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: بعد ١٠ ايام من ظهور الاوراق. يمكن تكرار التطبيق كل ١٤ إلى ٢١ يوم حتى الحصاد.
الفول السوداني	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن تكرار التطبيق كل ١٣ إلى ٢١ يوم حتى الحصاد.
قصب السكر	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن الرش بعد ١٤ إلى ٢١ يوم حتى شيخوخة الورقة.
التبغ	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	الرشة الاولى: عند ظهور ٢-٤ أوراق. يمكن تكرار التطبيق كل ١٤ إلى ٢١ يوم.
نباتات الزيتة	١١٨,٣ - ١٧٣,٢ مل/دونم	يبدأ التطبيق في مرحلة النمو في الربيع او عند ظهور اعراض نقص. يمكن اعادة الرش كل ١٤ إلى ٢١ يوم.

تحذير :

- يجب الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها.
- يجب الرش عند درجة حرارة أقل من ٣٢ درجة مئوية وعندما يكون الجزء الورقي جاف.
- لا يجب التطبيق عندما يكون النبات تحت الاجهاد، ويحبذ التطبيق بعد المطر بساعتين أو الري ولا يطبق عندما تكون أشعة الشمس قوية فيجب التطبيق في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الظهيرة.
- لا يطبق على الأشجار المثمرة الا عند التأكد أن المنتج لن يضر الثمار عند أي مرحلة من مراحل النمو.
- يجب اعادة التطبيق بعد ٣ - ٤ أيام.

السمية للنبات :

غير ضار للنبات عند استعماله بالنسب الموصى بها وينصح بعمل تطبيق على مساحة صغيرة قبل ٣-٧ أيام من التطبيق على مساحة كبيرة لملاحظة اي اثار قد تظهر على النبات المعامل.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمدة مع مراعاة التحريك و ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.