



تايلوزين-50%

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: يحتوي كل غم على:

500 ملغم

تايلوزين (تايلوزين تارتريت)

الاستطبابات :

- علاج الدجاج والحبش (الرومي) والعجول التي تعاني من الأمراض المعدية التي تسببها الكائنات الحساسة لتايلوزين (داء الميكوبلازما في الدجاج والحبش الرومي، التهاب الغشاء الزلالي المفصلي المعدي، داء البوريليا والتهاب الأمعاء النخري، التهاب الجيوب الأنفية المعدي في الحبش الرومي، التهاب الأمعاء في العجول والالتهاب الرئوي القصبي).

الجرعات :

- **العلاج:** بالنسبة للدجاج والديك الرومي، يجب إعطاء الدواء عن طريق الفم مذاباً في مياه الشرب، وبالنسبة للعجول في الحليب أو بدائله. يجب أولاً إذابة الكمية المستخدمة للعلاج من المنتج في كمية قليلة من الماء (عن طريق سكب الماء في البودرة وليس العكس)، ثم يجب خلط هذا المحلول مع الكمية المطلوبة من الماء.
- **العلاج:**
- الدجاج والحبش (الرومي): يجب خلط 1 غرام من البودرة مع 1 لتر من ماء الشرب وإعطائه لمدة 3-5 أيام.
- العجول: 2 غرام بودرة لكل حيوان، مرتين في اليوم، لمدة 7-14 يوماً.
- **الوقاية:**
- للدجاج والحبش (الرومي): يجب خلط 1 غرام من البودرة مع 1 لتر من مياه الشرب وفقاً للمخطط التالي:

مدة العلاج (أيام)	عمر الطيور المعالجة	أنواع الطيور و التصنيف
3 1	1 يوم 3 أسابيع	الدجاج اللحم
3 1 2 2	يوم 3 أسابيع 9 أسابيع 20 أسبوع	الدجاج البيض
5 2 2 2 2 2	يوم 4 أسابيع 9 أسابيع 16 أسبوع 20 أسبوع 24 أسبوع	قطعان الأمات
5 1	1 يوم 3 أسابيع	طيور الحبش (الرومي)



فترة سحب العلاج :

-لاستهلاك اللحوم:

•العجول: 14 يومًا.

•الدجاج :1 يوم.

• دجاج الحبش (الرومي): 5 أيام.

-لا يستخدم في الطيور المنتجة للبيض المعدّ للاستهلاك البشري.

موانع الاستعمال: لا يستخدم في الحيوانات أثناء تحصينها باللقاحات البكتيرية الحية.

تنبيه :

- يجب تغيير المحلول الدوائي كل 24 ساعة.
- يجب إذابة المنتج في الحليب أو بديل الحليب مباشرة قبل الاستخدام .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30° م.

العبوات : (100، 200، 250، 500، 1000) غم.

للاستعمال البيطري فقط