

فيروفاب – 1%

سائل للصب
قاتل للقراد ومبيد حشري

التركيب: يحتوي كل مل على:

10 ملغم

فيرونيل

الخواص:

علاج ومكافحة ذبابة القرن، القراد، ديرماتوبيا (ذبابة البوت البشرية)، القمل الماصغ والماص، وداء النغف. هو مبيد حشري مكونه الفعال الفيرونيل، وهو أحد أفراد فئة جديدة من المواد الكيميائية المعروفة باسم فينيلبيرازول التي تكافح الطفيليات الخارجية المقاومة للبيريثرويدات، مركبات الفوسفات العضوية، والأميديئات . نظرا لتركيبته (حجم صغير وجاهز للاستخدام) عند وضعه على خط ظهر الحيوان فإنه ينتشر على جلده وشعره لأنه يتفاعل مع الغدد الدهنية و إفرازاتها.

الفوائد:

فعالية عالية ضد القراد وسلالات ذبابة القرن المقاومة للبيريثرويدات، ومركبات الفوسفات العضوية، سهل الاستخدام، مكافحة فعالة لفترة أطول، توتر أقل إذ يحد من الحاجة للاستحمام والحركة المتكررة للحيوان، زيادة أكبر للوزن، أمن للحيوان والشخص الذي يتعامل معه.

الاستطبابات:

العلاج والسيطرة على ذبابة ذات القرن، القراد، القمليات العاضة و الماصة و النغف. علاج ومكافحة الطفيليات الخارجية التالية للماشية والأغنام والإبل والخيول وخنازير غينيا: القراد (بوفيلوس مايكروبلص)، ذبابة ذات القرن (هيموتوبيا اريتانس) القمل العارض (دامالينا بوفس) القمل الماص (لينوجانتاس فيتولي) و داء النغف العقدي (ديرماتوبيا هومينيس) و الذباب (ميلوفاجس اوفينوس)، و الدواجن: البراغيث (إيكيدونوفاجا جاليناسيا)، والقمل (مينوبون جاليني، لبيوريس كابونيس)، والعث (بشكل رئيسي العث الأحمر).

الجرعات و طريقة الاستعمال:

يستعمل بشكل موضعي (صب).

- الابقار، الاغنام، الجمال و الخيول: الجرعة الموصى بها: 1 مل لكل 10 كغ وزن جسم (بما يعادل 1 ملغم مادة فعالة لكل 1 كغ وزن جسم).
- خنازير غينيا والدواجن: 0.1 مل لكل كغ وزن جسم (بما يعادل 1 ملغم مادة فعالة لكل 1 كغ وزن جسم). والتي في الحقل تعادل قطرتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، توضع على ظهر الحيوان.
- يمكن أن تكون فترة العلاج كل شهرين على الأقل، تعتمد على شدة الإصابة والطقس وظروف الإدارة في القطيع.
- استشر الطبيب البيطري لتحديد الفترة الأفضل للعلاج.
- يوضع على طول الخط الظهري في شريط ضيق يمتد على طول الجزء العلوي من الظهر (بين الكتفين) إلى بداية الذيل.
- للحصول على أفضل نتائج، يجب استخدام فيروفاب على جميع الحيوانات في إطار برنامج مكافحة الطفيليات الخارجية.

فترة سحب العلاج:

- اللحم: 100 يوم.
- لا تستعمل في الأبقار المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري.
- لا تستخدم في الأبقار أو العجول الحامل ، المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري ، خلال 3 أشهر من الولادة المتوقعة.

تحذيرات:

- للاستعمال الخارجي فقط.
- لا يستخدم بطريقة استعمال أخرى.
- لا يوضع المنتج على الجلد المصاب.
- يتم وضع المستحضر على الحيوان في منطقة جيدة التهوية.
- لا يتم استعماله على الحيوانات المريضة و الضعيفة.

تنبيهات:

- لا يُعاد استخدام العبوات الفارغة.
- تجنّب تلويث مصادر المياه مثل الأنهار والجداول وغيرها.
- اغسل اليدين والجلد المعرّضين للمنتج بعد الاستعمال. في حال ملامسة الجلد مباشرة، يُغسل بكمية وافرة من الماء والصابون.
- في حال ملامسة العينين، تُغسل بكمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة.
- في حال الابتلاع، يُشرب الكثير من الماء والتوجّه فوراً إلى الطبيب مع هذه النشرة.
- في حال حدوث تسمم، يُنقل الشخص فوراً إلى الطوارئ وتُعرض هذه النشرة على الطبيب.
- لا يوجد ترياق مضاد.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف معتم، وبدرجة حرارة أقل من 30° م .

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.

للاستعمال البيطري فقط