

فوكسيفاب

مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

500 ملغم

فوكسيم

الخواص:

الفوكسيم مثبط لإنزيم الكولينستريز عند منطقة التشابك العصبي في العقد العصبية ويكون تثبيط هذا الإنزيم غير قابل للعكس في الظروف الفسيولوجية.

الاستطبابات:

يستعمل لعلاج النعف والجرب والإصابة بالقراد والقمل و العث في الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

الجرعات:

عن طريق الرش أو الفرك باستخدام الإسفنج أو الغسل، بعد التخفيف بالماء كما يلي:

الخيول	الابقار	الاعنام و الماعز	
الجرب:			
1 مل في لتر ماء (بأستخدام الإسفنج)	1 لتر في 1000 لتر ماء. الجرب القديم: 1 لتر في 500 لتر ماء.	1 لتر في 2000 لتر ماء. الجرب القديم: 1 لتر في 1000 لتر ماء.	الجرعة
النعف، القراد، القمل و العث:			
1 مل في لتر ماء (بأستخدام الإسفنج)	1 لتر في 1000 لتر ماء.	1 لتر في 2000 لتر ماء.	الجرعة

- **التعويض:** عند انخفاض حجم الماء بنسبة 20%، يعاد ملؤه بمحلول 250 مل من المستحضر في 125 لتر ماء. يمكن إعادة ملؤه في أول 3 أيام و تجديده بالكامل في اليوم الخامس.

- **فترة سحب العلاج:**

الابقار: اللحوم و احشائها: 40 يوم.
الحليب: لا يستعمل للابقار المرضعة، المنتج للحليب للاستهلاك البشري و في فترة التنشيف.

الاعنام، الماعز و الخيول:

اللحوم و احشائها: 28 يوم.
الحليب: لا يستعمل للحيوانات المرضعة، المنتج للحليب للاستهلاك البشري و في فترة التنشيف.

تحذيرات:

لا تستخدم الدواء قبل وبعد 10 أيام من تناول مثبطات الكولينستريز الأخرى، الفينوثيرازين أو مرخيات العضلات. لا يستخدم بالتزامن مع التخدير العام.

ISO 9001 & 14001 REGISTERED



DNV Certification B.V., The Netherlands

MGMT. SYS. RvA C024
MGMT. SYS. RvA C425

VAPCO

**VETERINARY & AGRICULTURAL
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



التخزين:

يحفظ في مكان جاف و معتم و بدرجة حرارة اقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.

للاستخدام البيطري فقط