بروفيفاب

(سائل للحقن)

التركيب : كل 1 مل يحتوي على :

كيتوبروفن	**100 ملغم.**

الاستطبابات:

الخيول:

- تخفيف من الالتهابات والآلام المصاحبة لاضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي.
- التخفيف من الآلام الحشوية المصاحبة للمغص.

الأبقار:

- العلاج الداعم للشلل الجزئي المرافق للولادة
- الحد من الحمى والتعب المرتبط بأمراض الجهاز التنفسي البكتيري عند استخدامه بالاقتران مع علاج مضادات الميكروبات حسب الاقتضاء.
- تحسين معدل الشفاء من التهاب الضرع الحاد ، بما في ذلك تسمم والتهاب الضرع الحاد، الناجم عن الكائنات الدقيقة سالبة الجرام ، بالتزامن مع العلاج بمضادات الميكروبات.
- تقليل وذمة الضرع المصاحبة للولادة.
- تقليل الآلام المصاحبة للعرج.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

الخيول: (عن طريق الوريد)

- حالات اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي: 1 مل لكل 45 كغم من وزن الجسم ، عن طريق الحقن في الوريد مرة واحدة يوميًا لمدة تصل 3 إلى 5 أيام.
- مغص الخيول: عن طريق الحقن في الوريد للتأثير الفوري، يمكن إعطاء جرعة ثانية إذا تكرر المغص.

الماشية: (عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي)

- 1 مل من المنتج لكل 33 كغم من وزن الجسم ، عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي العميق مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى 3 أيام.

موانع الاستخدام:

- لا يُستخدم في الحيوانات ذات حساسية معروفة للكيتوبروفن.
- لا تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى بشكل متزامن أو خلال 24 ساعة من تناولها، ومدرات البول ومضادات التخثر.
- لا تستخدم في الحيوانات التي تعاني من أمراض القلب أو الكبد أو الكلى ، حيث يوجد احتمال حدوث تقرحات أو نزيف في الجهاز الهضمي ، أو عندما يكون هناك دليل على وجود خلل في الدم.

تحذيرات:

- لا ينصح باستخدام كيتوبروفن في المهور التي تقل أعمارها عن 15 يومًا.
- يمكن أن يكون الاستخدام في أي حيوان أقل من 6 أسابيع من العمر أو في الحيوانات المسنة على مخاطر إضافية، إذا كان لا يمكن تجنب مثل هذا الاستخدام ، فقد تتطلب الحيوانات جرعة مخفضة وحذر في الاستخدام.
- لا يُعطى للخيول الحوامل.
- تجنب الاستخدام في أي حيوانات تعاني من الجفاف أو نقص حجم الدم أو انخفاض ضغط الدم حيث يوجد خطر محتمل لزيادة السمية الكلوية.
- تجنب الحقن داخل الشرايين.
- لا تتجاوز الجرعة المحددة أو مدة العلاج.

الآثار الجانبية:

- تفاعلات التهابية خفيفة في موقع الحقن.

التفاعل مع الأدوية الأخرى:

- لا تستخدم الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) بشكل متزامن أو في غضون 24 ساعة من تناولها ، أو مدرات البول أو مضادات التخثر.
- تجنب الإعطاء المتزامن مع الأدوية السامة للكلية.

فترة سحب العلاج:

اللحوم :

الأبقار: اللحوم ومشتقاتها: حقن عن طريق الوريد: يوم واحد، أما الحقن بالعضل: يومان.

الحليب : لا يوجد.

التخزين:

يحفظ على درجة حرارة أقل من 30 م°.

يحفظ بعيداً عن اعين ومتناول الاطفال

للاستعمال البيطري فقط