تيلميفين

(محلول للحقن)

التركيب: كل مل يحتوي على:

تيلميكوزين (تيلميكوزين فوسفات) 300 ملغم

كيتوبروفين 100 ملغم

الإستطبابات :

يُستخدم لعلاج والوقاية من الأمراض المعدية في الأبقار و التي تسببها الكائنات الحساسة لمادة التيلميكوزين، وخاصةً التهابات الجهاز التنفسي، والتهاب قرنية العين والملتحمة، تعفن القدم. يُخفف الكيتوبروفين الألم والحمى والالتهابات المصاحبة لأي أمراض معدية. يتميز بتقاربه العالي لبروتينات البلازما، مما يُسهّل مروره من خلال الإفرازات وتراكمه في مواقع الالتهاب.

يساعد الكيتوبروفين مادة التيلميكوزين، الذي يتميز بنفاذية ممتازة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بفعالية تامة في الأنسجة، مما يجعل وجود المادتين الفعالتين مع بعضهما أداة علاجية مثالية لعلاج التهابات الرئة والعين والقدم.

الجرعات وطريقة الاستخدام:

الجرعة الموصى بها للأبقار : 1 مل/30 كغم من وزن الجسم، من مرة إلى ثلاث مرات بفاصل 72 ساعة، وفقًا لتوصية الطبيب البيطري.

يعطى تحت الجلد فقط.

التحذيرات وموانع الاستخدام:

-لا يُستخدم للماعز.

-لا يستخدم عن طريق الوريد لأنه قد يكون مميتًا.

-لا يُستخدم للحيوانات شديدة الحساسية لأي من مكونات المنتج.

-لا يُستخدم للعجول التي تقل أعمارها عن شهر واحد أو الحيوانات التي تتغذى على الحليب فقط.

-لا يُستخدم المنتج مع الكورتيكوستيرويدات لأنه قد يؤثر على الغشاء المخاطي الموجود في الجهاز الهضمي

لا يُستخدم المنتج في الثلث الأخير من الحمل لأن الكيتوبروفين قد يُؤثر على الجهاز الدوراني للقلب للرضع.

-لا يُستخدم المنتج للحيوانات التي تعاني من أمراض الكلى أو الكبد.

-لا يُستخدم للحيوانات التي تعاني من الجفاف، أو انخفاض ضغط الدم، أو نقص الصفيحات الدموية، أو القرحة، أو غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي.

-لا يُستخدم للأبقار الحوامل.

تحذيرات:

- احرص على تقييد حركة الحيوانات قبل الاستخدام. لا تحقن أكثر من 20 مل لكل موضع حقن، ولا تخلط في المحقنة أو الأنبوب أو العبوة أي مادة غريبة على المنتج (مضادات حيوية أخرى، مضادات التهاب، أدوية تخدير، إلخ.....)

- اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التلامس للدواء بالخطأ أو الحقن الذاتي. يُستخدم تحت الجلد فقط، فالحقن العضلي قد يُسبب ردود فعل تحسسية. اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المنتج، ويُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يجب استخدام هذا المنتج تحت إشراف طبيب بيطري.

الجرعة الزائدة:

- في حالة الجرعة الزائدة، قد تظهر الأعراض التالية على الحيوانات: الأرق، والتقيؤ، وتسارع دقات القلب، وانخفاض انقباض القلب، والتشنجات، والوفاة.

- لا يوجد ترياق محدد، لذا يُنصح بتطبيق علاج الأعراض، حيث يُعوّض إعطاء أملاح الكالسيوم عن طريق الوريد تسارع دقات القلب.

- في حالة الحقن أو الابتلاع الخاطىء للدواء من الإنسان، استشر طبيبًا أو مركزًا لعلم السموم البشرية، وطبق علاج الأعراض، ولا يوجد ترياق محدد.

فترة السحب:

يُوقف العلاج قبل 28 يومًا على الأقل من الذبح، ويُمنع استخدامه مع الأبقار الحلوب المرضعة.

شروط التخزين:

يُحفظ في مكان جاف ومعتم بدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات : (50, 100) مل

للإستعمال البيطري فقط