فابكوكوكس-مقوى

سائل

التركيب: كل مل يحتوي على:

ديكلازوريل 250 ملغم

الخواص:

ينتمي ديكلازوريل إلى مجموعة بنزين أسيتونتريل، وله نشاط مضاد للكوكسيديا ضد أنواع الأيميريا. ويؤثر ديكلازوريل، حسب نوع الكوكسيديا، إما على المراحل الجنسية أو اللاجنسي من دورة نمو الطفيلي. يُمتص ديكلازوريل بشكل ضعيف من القناة المعوية، لذا فإن تأثيره الرئيسي هو على الكوكسيديا الموجودة في الأمعاء.

الاستطبابات:

فعالاً في الوقاية من وعلاج عدوى الكوكسيديا في الحملان التي تسببها ايميريا كرنداليس أو ايميريا اوفينويداليس وفي العجول التي تسببها ايميريا بوفيس أو ايميريا زوريني. في الحالات التي لا يوجد فيها تأكيد بشأن ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن داء الكوكسيديا، يوصى بفحص البراز.

فعال في الوقاية من وعلاج عدوى الكوكسيديا في الدواجن التي تسببها ايميريا تانيلا و ايميريا نكاتركس و ايمريا اسيرفلينا، ايميريا برنيتي، وايميريا ماكسيما.

- يعطى عن طريق الفم او العلف أو مياه الشرب.
- . يُنصح بمعالجة جميع حيوانات القطيع في نفس الوقت.

العجول والحملان:

العلاج: 1 مل /25 كجم من وزن الجسم .جرعة واحدة.

الوقاية: 1 مل /25 كجم من وزن الجسم عند عمر 4 – 6 أسابيع تقريبًا. في ظل ظروف العدوى المرتفع، قد يكون من الضروري اعطاء جرعة ثانية بعد حوالي 3 أسابيع من الجرعة الأولى.

الأرانب:

0.002مل /كغ من وزن الجسم. يعادل 0.05 ملغم ديكلازوريل /كغ من وزن الجسم.

•في العلف: 4 مل / 100 كغم من العلف الكامل.

الدواجن (الدجاج اللاحم):

- الأسبوع الأول: 30 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.
- الأسبوع الثاني: 37 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.
- الأسبوع الثالث: 44 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.
- الأسبوع الرابع: 51 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.
- الأسبوع الخامس: 58 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.
- الأسبوع السادس: 67 مل لكل 1000 لتر من مياه الشرب لمدة 3 أيام.

وهذا يعادل 0.3 ملغم ديكلازوريل /عم من وزن الجسم يوميًا.

فترة الامان:

اللحوم:
العجول و الحملان و الدواجن: 0 يوم.
الارانب: 2 يوم.

تنبيهات:

- لتجنب المقاومة، لا تستخدم المنتج لفترة طويلة، بل حاول استخدامه بالتناوب مع علاجات أخرى مضادة للكوكسيديا .
- عند خلطه مع العلف، يجب استخدامه فورًا.
- يجب استخدام ماء الشرب المعالج خلال 24 ساعة.

موانع الاستخدام:

لا يستعمل لدجاج بيض المائدة.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم و بدرجة حرارة اقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.

للاستعمال البيطري فقط.